

【販売名】オリーブ錠30 **第2類医薬品**

【成分】(本品30g中)
 白糖 澱グリセリン.....43(%)%
 添加物として塩化ベンザルコニウムを含有します。

【効能・効果】
 便秘

【用法・用量】
 12歳以上1回1個(30g)を直腸内に注入します。それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

【用法・用量に関連する注意】
 (1)用法・用量を守ること。
 (2)本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。
 (使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
 (3)12歳未満の小児には使用させないこと。
 (4)流産のみ使用すること。

【使用上の注意】
 してはいけないこと
 服用しないこと(服用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”)が生じ)薬剤にたよりがちになる。
 相換すること
 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 (1)医師の治療を受けている人。
 (2)妊婦または妊娠していると思われる人。(流産の危険性がある)ので使用しないことが望ましい。
 (3)高齢者。
 (4)ほげしい腹痛、悪心・嘔吐、痔出血のある人。
 (5)心臓病の診断を受けた人。
 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 (1)2～3回使用しても排便がない場合

【その他の注意】
 たちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがある。

【便秘しがちな方のために】

- 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間を決めて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょう。
- 繊維質の多い食物と水分を多くとるよう心がけましょう。
 (例：野菜類、果物、こんにゃく、カンタン、海藻等)
- 適度な運動、適度なマッサージ等を行うよう心がけましょう。
- 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
 (服用の原因になったり品質が変わる。)

【使用法】

- (1)容器先端のキャップを取りはずし、肛門部になるべく深く挿入します。(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端部分をぬらすと挿入しやすくなります。)
- (2)容器をおしつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
- (3)薬液注入後、十分便意が強まってから排便してください。

- 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- 冬季は容器を室温(40℃)に入れ体温近くまで温めると快適に使用出来ます。

製造番号
 使用期限

発売元 有限会社プロダクト・イノベーション <small>岡山県岡山県内野町2-3-10番地</small>	製造販売元 池田製薬株式会社 <small>宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 子安製薬ビル 仙台市青葉区 青葉7-4-15 5F 50100 受付時間 10～17時(土、日、祭日を除く)</small>
---	--

制作員 野村 裕彦 電話 0120-149-931

【販売名】オリーブ洗腸40・

第2類医薬品

【成分】(本品40g中)

白濁 澗グリセリン.....43(%)
添加物として塩化ベンザルコニウムを含有します。

【効能・効果】

便秘

【用法・用量】

12才以上1回1錠(40g)を直腸内に注入します。それで効果のみられない場合には、さらに再度をもう一度注入してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便秘が治まるまで、しばらくがまんすること。(使用後、すぐに排便を試みると薬効のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3) 12歳未満の小児には使用させないこと。
- (4) 沈黙にのみ使用すること。

【使用方法】

(1) 包装先端のキャップを取りはずし、肛門部になるべく深く挿入します。(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)

(2) 容器をおしつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。

(3) 薬液注入後、十分薬液が溜まってから排便してください。

●無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。

●冬季は容器を湯湯(40℃)に入れ体温近くまで温めると快適に使用出来ます。

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

適用しないこと(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになる。)

【相対すること】

1次の方は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(流産等の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) ほげしい腹痛、悪心・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

2次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 2～3回使用しても排便がない場合

【その他の注意】

たちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがある。

【便秘しがちな方のために】

○規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、便秘をもよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょう。

○繊維質の多い食物と水分を多くとるよう心がけましょう。

(例:野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻類)

○適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけましょう。

○早朝、起きた後に冷たい水又は牛乳等を飲むと便秘をもよおしやすくなります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わる。)

製造番号

使用期限

発売元

㈱株式会社アロケイ・イノベーション

岡山県山口市浜野町250番地

製造販売元

池原製薬株式会社

岡山県高松市西町2丁目2番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室 ☎0744-52-2055
受付時間:09:00～17:00(土、日、祝日を除く)