

第2類医薬品

販売名：ピタスセキトローチ
 特徴 ● 口腔内殺菌成分・セチルピリジニウム塩化物水和物を配合しており、のどの炎症によるのどの痛み・はれを抑えます。● 鎮痛成分・フェニールフタリン酸デキキストロメトルファンが咳中枢にはたらくので、つらい咳を抑えます。

使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。

【保管及び取扱上の注意】
 (1) 直射日光の当たらない涼しい所、少ない湿度の所に保管すること。
 (2) 小か手の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

▲ 使用上の注意

⊗してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他の鎮咳薬、かぜ薬、鎮痛薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、東物酔い薬、アレルギー用薬等)

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	呼吸器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気・嘔吐、食欲不振	めまい	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5〜6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】せき、たんの、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ、のどのあれ、のどの不快感、声がか
 【用法・用量】次の量を口中に含み、かまわずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
成人(15歳以上)	1個	6回	2時間以上
15歳未満		使用しないこと。	

<用法・用量に関連する注意>(1) 定められた用法・用量を厳守すること。(2) かんだり、のみかんだりしないこと。

【成分】6個(1日使用量)中

成分	含量
フェニールフタリン酸デキキストロメトルファン	60mg
グアヤコールスルヒホン酸力ケウム	140mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg


添加物セトキシプロピルセルロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、トメントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サリチン/Na、ショ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銅クロロフィン/Na、香料

製造販売元

大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区神田町1-27
 お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

副作用被害救済制度 TEL.0120-149-931

S220204



話しながら使える
 貼り付くトローチ

咳やたんを
 おさえる

ぴたっと

PITAS
 —ピタス—



実物大



移動中



会議中



販売中

販売名:
 ピタスセキトローチ

第2類医薬品

セルフメデイケーション

税 控除 対象

12 個入り

使用
 期限
 製造
 番号



4519 8625