

使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

デオブランカS

第2類医薬品

非ステロイド剤

＜鎮痒消炎薬＞

■製品の特長

デオブランカSは、有効成分のはたらきにより、下記の不快な症状を改善します。

①おりものによるかゆみ

日本人の食生活が洋風化することで、体内分泌物が変化しています。このためおりものが増加する傾向があります。

②生理時のかゆみ

生理時の経血には陰部の細胞や粘膜が混じっています。これらが雑菌の繁殖する原因となりかゆみや炎症を起こします。

③下着のかぶれ

ナイロン製のストッキングや下着のしめつけにより通気性が悪くなりかぶれやかゆみが生じやすくなっています。

④陰部周辺部のかゆみ

生理中や妊娠時、からだの抵抗力が弱くなっている時は、陰部の自浄作用が弱くなりかゆみが起りやすくなります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・はれ、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

裏面もお読みください。

【用法・用量】


1日数回、患部に適量を塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)同じ部位に他の外用剤との併用は避けてください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出してください。(①→②)

●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。



折り曲げないでください。

折りたたまないでください。

【成分・分量】

成分	100g中	はたらき
リドカイン	2.0g	局所を麻酔してかゆみを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	新陳代謝を促し、治療を促進します。
ジフェニヒドラミン塩酸塩	2.0g	抗ヒスタミン作用でかゆみの発生を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌効果で雑菌の繁殖を抑えます。

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、バラベン、ステアリルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチル、トリエタノールアミンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かないところに保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

ご注意 カンジダ症、トリコモナス症などの原因によるかゆみは、医師による根本治療が必要です。

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。
万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00 ~ 17:00 (ただし土日祝祭日は除きます)

副 作 用 被 害 救 濟 制 度 の 問 合 せ 先
(独) 医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電 話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142