

虫さされによる
かゆみ
炎症



繊維刺激の
かゆみ



あせもやかぶれによる
我慢できない
かゆみ



虫さされ
かぶれ
皮膚炎

セルフメティケーション
税控除対象

かゆみ



保管及び取り扱い上の注意

(1) 使用後はキャップをしっかりと締めてください。(2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



箱

発売元
株式会社プロダクト・イノベーション
富山県富山市浜黒崎239番地
製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

上段は使用期限、下段は製造番号です

MADE IN
JAPAN

[販売名] エフカイα
(鎮痒消炎薬)

第②類医薬品

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

(用法・用量に関する注意)
(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに又はぬるい湯で洗ってください。なお、炎症が重い場合には、眼科専門の診療を受けてください。(4) 本剤は外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

(100g中) ジフェニドミン塩酸塩1.0g、デキサメタゾン酢酸エチル0.025g、l-メントール3.5g、dl-カンフル1.0g、クロタミン5.0g、イソプロピルメチルフェノール0.1g、添加物として、モノアスコリ・酸クリセリン、モノアスリノ・酸リビタン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレーニヒドリシ、ジブリペングリル、ステアリルアルコール、セタノール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチル、エドテ酸ナトリウム水和物、ジカルビドロシジルエン、ジソプロパノールアミンを含有します。

開け口

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 部位には使用しないでください。
水痘(ぼうそう)、みずみししたむし等又是化膿している患部、2. 頭皮には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

☒ 読むところ

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬剤師又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人に。(5) 温湯浴やだれのひどい人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

△ 使用上の注意

レルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人に。(5) 温湯浴やだれのひどい人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位 症 状

皮 膚 発発発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

皮膚(患部) みずみししたむしの白濁に、きび、化膿症状、持続的刺激感

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は

使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。