

服用前に、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

# 胃もたれ・胸やけ・胃の痛みに 漢方胃腸薬「SP」(細粒)

第2類医薬品

## 安中散・芍薬甘草湯エキス末 配合

- 安中散と芍薬甘草湯エキス末を配合した胃腸薬です。
- 胃の痛みや胃のもたれ、胸やけなど、胃腸の諸症状の改善に効果を発揮します。



### 使用上の注意



**してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

- 心臓病の診断を受けた人



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
  - (3) 高齢者
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - (5) むくみのある人
  - (6) 高血圧、腎臓病の診断を受けた人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
- 次の場合は、服用中又は服用後に、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。
  - 長期連用する場合

**【効能・効果】**

胃痛、腹痛、胃部不快感、胃炎、胃のもたれ、胃酸過多、げっぷ、胸やけ、はきけ、食欲不振、腹部膨満感

**【用法・用量】**

次の1回量を1日3回、**食前又は食間に**服用してください。

食間（食事と食事の間）の服用は、**食事の後2～3時間**を目安にしてください。

年 齢	成人(15歳以上)	5歳以上15歳未満	5歳未満
1回量	1包	1/2包	服用しないこと

**<用法・用量に関連する注意>**

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【成分・分量】 1包(1.2g)中**

成 分	分 量	成 分	分 量
<b>安中散</b> (下記生薬の混合粉末)	<b>700mg</b>	<b>芍薬甘草湯エキス末</b> (下記生薬の抽出乾燥エキス末)	<b>170mg</b>
ケイヒ（桂皮）	200mg	シャクヤク（芍薬）	340mg
エンゴサク（延胡索）	150mg	カンゾウ（甘草）	340mg
ボレイ末（牡蠣）	150mg		
ウイキョウ（茴香）	75mg	(はたらき)	
シュクシャ（縮砂）	50mg	胃腸の筋肉の緊張をやわらげる作用があり、胃痛や腹痛等をしずめます。	
カンゾウ（甘草）	50mg		
リョウキョウ（良姜）	25mg		
(はたらき)		※添加物として、カルメロースNa、トウモロコシデンプン、乳糖を含有します。	
胃腸のはたらきを活発にする作用があり、胃のもたれや胃部不快感などの症状を改善する効果があります。		<成分に関連する注意>	
		本剤は生薬を用いた製剤であるため、製品により色が多少異なることがあります。品質に問題はありませぬ。	

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

**【販売名】 漢方胃腸薬「SP」（細粒）**

サイキョウ・ファーマ お客様相談窓口

**フリーダイヤル: 0120-456-787**

(受付・平日10:00～17:00 ※土・日・祝日を除く)

E-Mail: info@saikyo-pharma.co.jp



製造販売元

**株式会社サイキョウ・ファーマ**

東京都江東区亀戸5-6-21

www.saikyo-pharma.co.jp