

【使用上の注意】

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
次の人は使用しないでください。
 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：口内のひどいただれ
 - 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (7775157)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、しやみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3,5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元
 大阪府守口市南寺方東通1-4-12
 昭和製薬株式会社
 お客様相談窓口 0120-920-598
 受付時間 9~17時(土・日・祝日を除く)

のどの殺菌消毒に



うがい薬 PI
 ポビドンヨード
300mL

第3類医薬品

【効能・効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法・用量】

1回、本剤2~4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいしてください(付属のコップの2と4の線まで本品を入れ、水を60の線まで加え、うすめてからうがいしてください)。

＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。うがい薬はきざせない年齢の小児には使用させないでください。
- うがい用のみ使用し、キズややけどへの使用や内服しないでください。
- 本剤は使用するときとうすめて、早めに使用してください。

【成分・分量】


本品1mL中、ポビドンヨード 70mg
 (有効ヨウ素 7mg含有)
 添加物として、エタノール、ヨウ化カリウム、サッカリンナトリウム水和物、ユーカリ油を含む。

＜成分・分量に関連する注意＞


本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 衣類に付着したときはすぐに洗い流してください。
- 使用後はすぐに洗面台等を水で洗い流してください(そのまま放置すると、洗面台等が変色することがあります)。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。




販売名：ポビガール「昭和」 第3類医薬品
 副作用被害救済制度 電話 0120-149-931




U1701

使用方法



1 本品を2と4の線の間まで入れる



2 水を60の線まで加え、うすめてからうがいする