

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 芳香性健胃消化薬 **太田胃散**

⚠ 使用上の注意

⊗してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1. 透析療法を受けている人は服用しないでください 2. 長期連用しないでください

🗨️相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人。 2. 服用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果 飲みすぎ、胸やけ、胃部不快

感、胃弱、胃もたれ、食べすぎ、胃痛、消化不良、消化促

進、食欲不振、胃酸過多、胃部・腹部膨満感、はきけ(胃のむか
つき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、胃重

■用法・用量 成人(15歳以上)1回1.3g、8~14歳 1回0.65g、1日3回食後

又は食間に服用してください。8歳未満は服用しないでください。(添付のさじ
はすり切り1杯で約1.3gです。中ぶた裏のすり切り板をご使用ください。食間とは
食後2~3時間のことをいいます。) **<用法・用量に関連する注意>** 水又はぬるま湯
で服用してください。小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用
させてください。

■成分 (1.3g中) ケイヒ92mg、ウイキョウ24mg、ニクズク20mg、
チョウジ12mg、チンピ22mg、ゲンチアナ15mg、ニガキ末15mg、炭酸水素ナトリ
ウム625mg、沈降炭酸カルシウム133mg、炭酸マグネシウム26mg、合成ケイ酸
アルミニウム273.4mg、ピオチアスターゼ40mg (添加物) トメントール **■保**

管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所
に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

<製品のお問い合わせ先> お客様相談室 ☎(03)3944-1311

受付時間9:30~17:00(土、日、祝日等を除く)

製造販売元 株式会社 太田胃散

東京都文京区千石2-3-2