

胃腸薬 **キャベジン[®]ユー^α**

キャベジン[®]ユー^αは、弱ってきた胃を元気に動かし、正常な胃の働きを取り戻していく胃腸薬です。

製品特長

- 荒れて傷んだ胃の粘膜を修復し、正常な状態に整える有効成分MMSC^{*}に加え、胃の働きを促進する生薬成分ソヨウを配合。
 - 毎食後1日3回の服用で胃が元気に動くようになり、弱った胃の働きを取り戻していきます。
 - 外層と核錠から成る二層(ダブルレイヤー)構造の錠剤で、それぞれの有効成分が効果的に働きます。
- ※メチルメチオニンスルホニウムクロリド:キャベツ汁中の胃粘膜修復成分として見つかった成分で、ビタミンUとも呼ばれていました。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬
- ② 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

👤 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。 排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 口のかわき
- ④ 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重

(裏面へ続く)

用法・用量

下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠 ○○	3回
8歳以上15歳未満	1錠 ○	
8歳未満の小児	✕ 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意> ①用法・用量を厳守してください。②小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量(6錠中)

●メチルメチオニンスルホニウムクロリド 150.0mg ●炭酸水素ナトリウム 700.0mg ●炭酸マグネシウム 250.0mg ●沈降炭酸カルシウム 1200.0mg ●ロートエキス3倍散 90.0mg (ロートエキスとして 30.0mg) ●ソヨウ乾燥エキス 30.0mg (ソヨウとして 270.0mg) ●センブリ末 30.0mg ●バイオアスターゼ2000 24.0mg ●リパーゼAP12 15.0mg [添加物]ヒドロキシプロピルセルロース、硬化油、カルメロースCa、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、セラック、タルク、ケイヒ、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、セルロース、二酸化ケイ素、l-メントール、デキストリン<成分・分量に関連する注意>メチルメチオニンスルホニウムクロリドなどが配合されていますので、特有のニオイがあります。

保管及び取扱い上の注意

①高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)④水分が錠剤につくと、特有のニオイが強くなったり内容成分の変化のもととなりますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。⑤ビンの中の詰め物(ビニール)は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れているもので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。⑥ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。⑦外箱及びラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。⑧使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。



本製品に関するお問い合わせ

お問い合わせのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

Y1201R
W2K
0000F

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>

 製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Languages

English

简体字

繁體字

한국어

<https://hc.kowa.co.jp/otc/tenpu>

