

第2類医薬品

Kowa

コルゲンコーワ 液体かぜ薬

かぜのひきはじめに効く

ま お う と う
麻黄湯

眠くなる
成分を含んで
いません。

〈かぜの初期症状〉

- 寒け・発熱
- ふしぶしの痛み



セルフメディケーション

税 控除 対象

この外箱は、服用の際にはよく読み、大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 胃腸の弱い人。
(4) 発汗傾向の著しい人。
(5) 高齢者。
(6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

■ 用法・用量

下記の量を食前又は食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満の小児	×服用しないこと	

- 食間とは「食事と食事の間」のことで、たとえば朝食と昼食の間のことをさします。食事中に服用するというものではありません。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は本質的に沈殿を含んでいるので、服用の際には瓶をよく振ってください。

■ 成分・分量(90mL中)

本品90mL(30mL×3本)中、以下の生薬より抽出した麻黄湯エキス81mLを含有しています。
マオウ 5.0g ケイヒ 4.0g キョウニン 5.0g カンゾウ 1.5g
〔添加物〕白糖、パラベン、香料、エタノール、プロピレングリコール

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 瓶をあけたら飲みきってください。
- (6) 瓶をあけたまま保存しないでください。

製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

漢方製剤

コルゲンユー 液体かぜ薬

第2類医薬品

ま お う と う
麻黄湯

古くよりかぜのひきはじめての「寒け」「発熱」「ふしぶしの痛み」等に用いられており、これらの症状にすぐれた効果を発揮することが知られています。

お問い合わせ先
興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755
月～金(祝日を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931