

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

ガスだまり改善薬



整腸薬

販売名:ガスピタンa

第3類医薬品

Medicine for Intestinal Disorders

特徴

- 消泡剤(ジメチルポリシロキサン)が胃や腸内に発生したガスだまりをつぶし、おなかのガスだまり(膨満感)を改善します
- 3種類の乳酸菌が、おなかの調子を整えます
- 消化酵素(セルラーゼAP3)が食物繊維を分解し、ガスの発生を抑えます

⚠️ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢
 4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘

用法・用量

大人(15才以上) 1回1錠。
1日3回、食前又は食間にかみ砕くか口中で溶かして服用してください(15才未満は服用しないこと)
<用法・用量に関する注意>
(1) 定められた用法・用量を厳守すること
(2) 本剤は必ず、かみ砕くか、又は口中で溶かして服用すること
●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

成分・分量 1日量(3錠)中

成分	分量
ラクトミン(フェカリス菌)	24mg
ラクトミン(アシドフィルス菌)	54mg
ビフィズス菌	24mg
セルラーゼAP3	180mg
ジメチルポリシロキサン	180mg

添加物として、ラクチール、セルロース、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、CMC-Na、香料を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

<錠剤の取り出し方>

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる)



製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

あつらいいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 明治薬品株式会社
〒939-3548 富山県富山市三郷6