

〔効能・効果〕のどの炎症によるのどの痛み・のどはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎
〔用法・用量〕1日数回、適量を患部に噴射塗布してください

〔用法・用量に関する注意〕
(1)のどの炎症の場合には、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)。(2)小児に使用させ場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(4)噴射塗布のみに使用すること(5)薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

〔成分・分量〕100mL中
アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物……………0.02g
セチルピリジニウム塩化物
水和物……………0.3g
添加物として、プロビレングリコール、ブロメロース、サッカリンNa、
リン酸二水素Na、リン酸水素Na、
エタノール、メントールを含有する

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

Throat Repair Medicine 第3類医薬品

口腔咽喉薬 販売名: のどぬーるナイテクト

△使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 長期連用しないこと

⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の症状のある人: 口内のひどいだれ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、吐き気

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口の刺激感

4. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

MADE IN JAPAN 紙箱 ポンプキャップ
10187875

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(箱底面及び容器ラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないこと

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない
湿気の少ない涼しい所に、キャップをしっかりとしめて立てて保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

●使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること ●携帯する場合は、添付のビニール袋に入ること ●使用中に薬液がこぼれ衣類等が着色したら、すぐに水洗いすること ●液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針等で突かないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお願いいたします

＼あつたらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3