

販売名:  
ニュータムシチンキゴールド a  
Medicine for Athlete's Foot

第2類  
医薬品

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください  
<用法・用量に関する注意>

(1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (4) 外用にのみ使用すること

成分・分量 100mL中

オキシコナゾール硝酸塩…1g、クロタミトン…5g、リドカイン…2g、グリチルレチン酸…0.5g、l-メントール…1g  
添加物として、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、BHTを含有する

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

あつらいいな/モカチにする

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先 (お客様相談室)

0120-5884-01

9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等 (2) 湿疹(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 乳幼児 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が顔面又は広範囲の人 (5) 患部が化膿している人 (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人 (陰のうにかゆみ、ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、乾燥感、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくなり  
ない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 火気に近づけないこと (エタノール含有物) ●使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること ●本剤は合成樹脂等を軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、家具や床等につかないようにすること

ハケ付で患部に塗りやすい

使用に際して、この説明書きを必ず読むこと。また必要なときに読めるよう大切に保管すること。使用期限(パッケージ底面及び容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ  
エタノール含有物 水溶性

税 控除 対象

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931  
MADE IN JAPAN