

足がつる

こむらがえり、筋肉のけいれん



コムレケア^a

生薬最大量抽出^{※1}より

満量処方^{※2}



第2類医薬品

※1 日本薬局方芍薬甘草湯エキス内
体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みの
あるものの次の諸症:こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みの
あるものの次の諸症:こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

Medicine for Leg Cramps

漢方製剤

用法・用量

大人(15才以上)1回4錠、7才以上15才未満1回
2錠、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用
してください(7才未満は服用しないこと)

<用法・用量に関連する注意> (1)定められた用法・用量
を厳守すること (2)小児に服用させる場合には、保護者
の指導監督のもとに服用させること ●食間とは「食事と
食事の間」を意味し、食後約 2~3 時間のことをいいます

△使用上の注意

※してはいけないこと(守らないと現在の
症状が悪化したり、副作用が起こりやすくな
る) 1. 次の診断を受けた人は服用しないこと:
心臓病 2. 症状があるときのみ服用にこと
ども、連用しないこと

■相談すること 1. 次の人は服用前に医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医
師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠
していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 次の症
状のある人: むくみ (5) 次の診断を受けた人:
高血圧、腎臓病 2. 服用後、次の症状があら
われた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること。ま
れに右記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりす ると息切れがする・息苦しくなる、空 を歩くと、発熱等がみられ、これらが急 にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感 やこわばりに加えて、脱力感、筋 肉痛があらわれ、徐々に強くなる
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、 胸部の不快感、胸が痛む、めまい、 失神等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白 目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだ るさ、食欲不振等があらわれる

3. 5~6回服用しても症状がよくならない
場合は服用を中止し、この箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること

※2 満量処方: 日本薬局方芍薬甘草湯12g
処方から抽出したエキスを全量(最大量)配合

成分・分量 1日量(12錠)中 MADE IN JAPAN

芍薬甘草湯エキス 2400mg [シャクヤク・カンゾウ 各6.0g
より抽出] 添加物として、CMC-Ca、二酸化ケイ素、ステアリン
酸 Mg、タルク、セルロースを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、
錠剤の色が多少異なることがあります
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要ときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること(2)小児
の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用
の原因になったり品質が変わる)(4)本剤をぬれた手で扱わないこと(5)1包を分割して服用する場合、
残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること。また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服
用するか捨てること

あったらいいな/をカタチにする
発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

用するか捨てること
製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3