

第2類医薬品

セルフメディケーション
税 控除 対象

使用
期限

製造
番号

ひきはじめのかぜに カコナル[®] ツー²

45mL×2本 1日分 1日2回タイプ

ひきはじめのかぜに

第2類医薬品

第2類医薬品

カコナル[®] ツー²

そのまま飲める
液体タイプ

「カコナル[®]2」は、そのまま服用できる液体タイプです。伝統的な漢方煎じ薬の製法にのっとり、生薬の力を大切に活かして水製抽出した葛根湯です。ひきはじめのかぜによく効きます。

ひきはじめのかぜに カコナル[®] ツー²

ひきはじめのかぜに

第2類医薬品

カコナル[®] ツー²

体力中等度以上の方の

感冒の初期に

鼻かぜに

頭痛に

すぐに飲める液体タイプ

眠くなる成分を
含まない

1日2回タイプ

45mL×2本
1日分

第一三共ヘルスケア



感冒の
初期



鼻かぜ



頭痛

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

使用前にこの箱の説明文
書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよ
う大切に保管して下さい。

開封口

カコナル[®]2
45mL×2本

第2類医薬品

水製抽出液葛根湯

使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位 症状
皮膚 発疹・発赤、かゆみ
消化器 吐き気、食欲不振、胃部不快感
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称 症状
偽アルドステロン症、ミオパチー 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

次の量を朝夕、食前又は食間によく振ってから服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないで下さい。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守して下さい。
(2) 本剤は1回1本飲みみです。
(3) 本剤は本質的に沈殿を含んでいます。

【成分・分量】 90mL(45mL×2本)中
葛根湯濃縮液……81mL
(下記生薬の水製抽出液)

白芍薬 8g 白芍薬 4g
白芍薬 4g 白芍薬 3g
白芍薬 3g 白芍薬 2g
白芍薬 1g

添加物：D-ソルビトール、白糖、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

〈お問い合わせ先〉
第一三共ヘルスケア(株) お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



4 987107 604972

MADE IN JAPAN

®登録商標



●この箱は環境に優しいベジタブルインキを使用しています。