

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬

ロキソニンSパップ

第2類医薬品

7枚入
(7枚×1袋)

特徴

すぐれた鎮痛消炎効果をもつ [ロキソプロフェンナトリウム水和物] を配合。

肌から吸収されると活性型に変化、
つらい痛みのお芯まで直接浸透してしっかり効く。

1日1回使用。貼り心地がよく、
すぐれた伸縮性ではがれにくい。

広範囲な部位に
使いやすい。

スーッとこごちよい
冷感タイプ。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを
起こしたことがある人
 - (3) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) しっしん、かぶれ、傷口
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないで下さい。
4. 連続して2週間以上使用しないで下さい。(本剤は痛みを一時的におさえるもので、
痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けて下さい)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の診療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 高齢者
 - (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく



使用上の注意

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を
中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
そ の 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を
受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は
増強が見られた場合には、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談して下さい。 下痢・軟便
4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(他の疾患の可能性もあります)

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、
肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付して下さい。
(用法・用量に関連する注意) (1)用法・用量を厳守して下さい。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている
病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して
下さい。(3)1日あたり2枚を超えて使用しないで下さい。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き
とってから使用して下さい。(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を
目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。

成分・分量(膏体100g中)

成 分	分 量	はたらき
ロキソプロフェンナトリウム 水和物	1,134g (無水物として1g)	炎症や痛みのもと[プロスタグラン ジン]をおさえます。

添加物：ハッカ油、ポリソルベート80、酸化チタン、酒石酸、エドト酸Na、グリセリン、カルメロースNa、
タルク、水酸化Al、クロタミトン、ポリアクリル酸部分中和物、その他2成分

[1枚あたり(10cm×14cm)膏体量10g]

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の
届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因
になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、
袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は
使用しないで下さい。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daichisankyo-hc.co.jp/>

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

リードケミカル株式会社

富山県富山市日俣77-3

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN



●この箱は環境に優しいノンVOC
インキを使用しています。

