

**必ずうすめて使用すること**

〔使用上の注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないこと  
顔面、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)や陰股部(陰のうなど)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 患部が広範囲の人。
  - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

〔効能および用法・用量〕

1. 手指の殺菌消毒：本剤を水で100～200倍にうすめた液(ベンザルコニウム塩化物0.05～0.1%溶液)で洗う。
2. 創傷面の殺菌消毒：本剤を水で400～1,000倍にうすめた液(ベンザルコニウム塩化物0.01～0.025%溶液)で患部を洗うか、脱脂綿またはガーゼなどに浸して患部に軽く塗る。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法を守ること。(2) 原液のまま使用しないこと。
- (3) 原液または濃厚液が皮膚に付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐ水で洗い流すこと。(4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(6) 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿などに浸して貼付しないこと。(7) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。(8) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

10 w/v %

第3類医薬品



600mL

殺菌消毒剤

日本薬局方

ベンザルコニウム塩化物液

オスバン®

〈逆性石けん液〉

〈成分〉 ベンザルコニウム塩化物、10w/v%水溶液  
(塩化ベンザルコニウム)

製造販売元

日本製薬株式会社  
東京都中央区明石町8番1号

販売元

武田コンシューマヘルスケア株式会社  
大阪市中央区道修町四丁目1番1号

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。(5) 皮革製品に付着した場合は、変質させることがあるので注意すること。(6) 染色した布地は退色することがあるので注意すること。

〔その他の公衆衛生・家庭衛生分野での使用方法〕

1. 食器・器具類の消毒：茶碗、皿、コップ、ナイフ、包丁類、調理器具などは水洗いした後、本剤の200～500倍液に5分以上浸した後水洗いする。
2. 家屋、乗物などの消毒：床、畳、家具、調度品、手洗場、浴槽、便所、座席、手すり、電話機などは、本剤の200～500倍液で拭拭するか、または噴霧する。
3. ごみ箱、冷蔵庫の消毒：本剤の100～200倍液を噴霧する。
4. その他：食品工場、清涼飲料水工場、缶詰・製菓工場の施設、器具の消毒には本剤の200～500倍液を用いる。

〔希釈方法〕

本剤のキャップ1杯は約5mLである(下図)。  
〈キャップを用いたうすめ方〉

- 100倍液…本剤2杯を水1Lにうすめる。
- 200倍液…本剤1杯を水1Lにうすめる。
- 400倍液…本剤1杯を水2Lにうすめる。
- 500倍液…本剤2杯を水5Lにうすめる。
- 1,000倍液…本剤1杯を水5Lにうすめる。



お問い合わせ先：日本製薬 0120-00-8414  
9:00～17:30(土日祝日・弊社休業日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
電話 0120-149-931

使用期限

製造番号



容器を包んでいる透明フィルムが破れている等、開封された形跡がある場合は使用しないでください。



瓶 : PE  
キャップ : PE  
外装フィルム : PP