

軽皮痛痛消滅剤

販売名：
サロンパス®
ローション

こころを
押し開けて
ください。

第3類
医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、
必要に応じてすぐ読めるように大切に保管してください。

特
長

- 有効成分サリチル酸グリコールにより肩こり、
筋肉痛にすぐれた効果を生揮します。
- スーッと心地よいサロンパスの刺激がコリを
ほくします(爽快刺激感処方)。
- “塗り”ボトル採用で塗りにくい部位にも楽に
塗布できます。
- 微香性なので外出先でも安心してご使用いただけます。

Salonpas®

詳しい
情報は▶



※塗布した後、運動など
をしますと、強い刺激(ヒ
リヒリ感)を感じる事が
あります。刺激が強すぎる
時は使用を中止してく
ださい。石けんで洗い流
すと刺激は緩和します。

▼久光製薬の環境Aの取り組みHELLO!ecol
プロジェクトの詳細はこちらA
<https://www.hisamitsu.co.jp>

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなります。】

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、ただれ、傷口、化膿部位。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売
者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたこ
とがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるので、直ちに使用を中止し、
この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者
にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合
は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師
又は登録販売者にご相談ください。

成分・分量

100g中に次の成分を含んでいます。

サリチル酸グリコール…………… 3.0g
 ノナ酸パニリルアミド…………… 0.015g
 ニコチン酸ベンジルエステル… 0.02g
 グリチルチレン酸…………… 0.05g
 0-メントール…………… 5.0g

添加物として、エタノール、プロピレングリ
コールを含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光を避け、キャップをしっかりと閉め
て涼しい所(冷暗所)に立てて保管して
ください。
- (2) 小児の手が届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤
用の原因になったり、品質が変わることが
あります)。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣
類、プラスチック類、塗装のしたある床・
家具等に付着すると変質することがあ
りますので、付着しないように注意して
ください。
- (6) 衣類に付着した場合には、なるべく早く
水又は洗剤で洗ってください。
- (7) 使用期限を過ぎた商品は使用しないで
ください。

火気厳禁

第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ
(エタノール、プロピレングリコール)

発売元 久光製薬株式会社
〒841-0017 鳥栖市田代大官町 408番地

久光製薬お客様相談室：
TEL.0120-133250
受付時間 / 9:00-17:50
(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
〒931-8412 富山県富山市横越 168



8721HJ

hisamitsu®

肩こり・筋肉痛に

サロンパス ローション



当社化粧品に比べて
容器サイズを小さく
しました。



爽快刺激感処方 サッと手軽に らくすり®

効能・効果

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉疲労、筋肉
痛、打撲、ねんざ、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布
してください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法・用量を厳守してく
ださい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用させて
ください。
- (3) 目に入らないよう注意してくださ
い。万一、目に入った場合には、す
ぐに水又はぬるま湯で洗ってくだ
さい。なお、症状が重い場合には、
眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤のついた手で、目など粘膜に
ふれないでください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 入浴前後の使用は避けてください。
- (7) 入浴等で肌をすったり、夏場など
汗をかいた時は、本剤による刺激
を強く感じる場合があります。激しい
痛みや刺激感やゆりみを感じた
場合には、使用を中止し、こすらな
いでやさしくなでるように患部をよ
く泡だてた石けんと水で数回洗っ
た後、患部を冷水や軽くしぼった
ぬれタオルなどで十分に冷やして
ください。症状の改善がみられない
場合は、この箱を持って医師に
相談してください。
- (8) 塗布した患部をコタツや電気毛布
で温めないでください。
- (9) 皮膚の弱い人は、同じ所に続けて
塗布しないでください。
- (10) 本剤を塗った後の患部を通気性の
悪いものでおおわないでください。
- (11) スポンジに薬液を十分しみこませ
てから患部に塗布してください。薬
液をスポンジ面ににじませないで
使用すると、スポンジが破損する場
合があります。

セラムメディケーション
税 控除 対象

微香性

第3類医薬品 85mL



スポンジに薬液を十分しみこ
ませてからご使用ください。