

トラベロップQQ G(ぶどう味)

2錠×4包

第2類医薬品

乗物酔い薬

この箱はお薬とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。]

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳痰液、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)。

■ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 排尿困難のある人 (6) 緑内障、心臓病の診断を受けた人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

[皮膚] 発疹・発赤、かゆみ [精神神経系] 頭痛 [泌尿器] 排尿困難 [その他] 顔のほてり、異常なまぶしさ
まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
[再生不良性貧血] 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 [無顆粒球症] 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。 口のかわき、便祕、眠気、目のかすみ

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

成分・分量(2錠中)

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
1.333mg

スコボラミン臭化水素酸塩水和物
0.166mg

添加物として還元水アメ、水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、白糖、アセスルファムK、塩化Na、DL-リンゴ酸、D-ソルビトール、香料含有

用法・用量

乗物酔いの予防には乗車船30分前に、下記の1回量をかみくだくか、又は口中で溶かして服用してください。なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。

年齢	1回量	服用回数
11才以上	2錠〇〇	1日2回を限度とする
5~10才	1錠〇	
5才未満	服用しないこと×	

●定められた用法、用量を厳守してください。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

製造販売元

 株式会社 浅田館
東京都東村山市久米川町 5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室

電話 03-3953-4044

時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 開封後は袋の口を折り返して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。