

コンタクトレンズを外した後に奥まで洗える

イージーカップ

下向き、上向きでも洗やすい



しっかり洗って眼病予防

ロート フラッシュ®

すっきり洗浄 クリアな瞳に

瞳にやさしい製剤

・涙に近い浸透圧

・涙に近いpH

防腐剤*無添加




第3類医薬品

ROHTO®

この外箱は、本剤とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。

ロートフラッシュ® 洗眼薬

⚠ 使用上の注意

相談すること 

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人：眼球乾燥症候群(ドライアイ)
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

●その他、目に何らかの異常が感じられた場合

効能・効果

目の洗浄、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

用法・用量

添付のアイカップで、1日3~6回、1回5mLを用いて洗眼してください。

※詳しい使い方は裏面をご覧ください。

——— 用法・用量に関連する注意 ———

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。また、再装着する場合は、洗眼してから10~15分程度あけてください。
- アイカップは使用前後に水道水で十分に洗浄してください。
- 混濁したものは使用しないでください。
- 洗眼用にのみ使用してください。
- 長期連用しないでください。

成分

グリチルリチン酸二カリウム …………… 0.025%
 クロルフェニラミンマレイン酸塩 …………… 0.003%
 L-アスパラギン酸カリウム …………… 0.1%
 ※添加物として、ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-カンフル、ペパーミントオイル、プロピレングリコール、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤を含有する。

*防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。

第3類医薬品

より使いやすくなりました!

下向きだからラクラク洗眼



使いやすさを追求した イージーカップ

POINT 1

**吸着フィット
してこぼれない!**

柔らか素材のカップで目の周りにやさしくフィットする

POINT 2

**汚れをかき出す
対流洗浄!**

つまんで起こる対流効果で腫すっきりまる洗い

使い方

目のまわりのよごれや化粧をふきとってからご使用ください。



- 1. そそぐ** 本剤をアイカップに5mL(カップの内側の線まで)入れます。
- 2. フィットさせる** 下を向いて、カップを片方の目に押し当ててください。カップの下部(くぼみの下)を数回つまむことでカップが吸いつくようにフィットします。
- 3. 洗う** フィットさせたまま、まばたきを数回繰り返してください。
※もみ洗いもできます。カップの下部(くぼみの下)を数回つまむと対流が起こりより洗眼しやすくなります。
●上向きで洗眼する場合は、液がこぼれないように上を向き、そのまま数回まばたきをしてください。
●あまり長い間(10秒以上)、洗眼しつづけないでください。
- 4. 反対の目を洗う** 液を捨ててカップを洗浄してから、もう片方の目も同様に洗眼してください。
●片方の目を洗った本剤は、もう片方の目に使用しないでください。
- 5. カップの洗浄** 使用後はカップを十分に洗浄してください。
●カップに残った水分は清潔なティッシュ等でふき取るか、自然乾燥をおすすめします。

—— イージーカップ
詳細は裏面参照



持ちやすくなったボトル

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) アイカップは他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱・容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の口周辺につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。

清涼感
レベル
(当社比)



お問合せ先 お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1