

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

目薬

販売名：ロートアイストレッチ 第2類医薬品

コリかたまつ目の筋肉に。

ROHTO 【アイストレッチ】[®] 12mL

Eyestretch 目の疲れ・目のかすみ*に



*目やにの多いときなど

〈近くを見るとき〉

- ・ピント調節筋/緊張する
- ・水晶体/ふくらむ

〈遠くを見るとき〉

- ・ピント調節筋/ゆるむ
- ・水晶体/薄くなる



働くピント調節筋にダイレクト作用。

近くを見たり遠くを見ると、ピント調節筋と呼ばれる筋肉が上図のように働きます。筋肉の一種ですから、疲れてくればコリかたまつきます。

「ロートアイストレッチ」は、有効成分のネオスチグミンメチル硫酸塩がピント調節筋の疲れをほぐして効果的に働きます。また、抗ヒスタミン作用を持つクロルフェニラミンマレイン酸塩配合で、目のかゆみを抑えます。パソコンや読書などで、「目が疲れたなあ」というときには「ロートアイストレッチ」。



キャップの
開け方

キャップを手前に
ひねってください。



キャップの
閉め方

カチッと音がするまで
押し下げてください。



※容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。

容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだしてもれることができます。



18世紀に、日本の医学の振興を目指して翻訳された“解体新書”。その開拓の思想のもとに、ロートは現代人の目の疾患をあらゆる方向から見つめ直しています。現在までに培ってきたノウハウと最新技術で酷使される目に応えたい、その想いを「解眼新書」の文字に託しました。

使用上の注意

相談すること



1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
　　はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
　　緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目にに入ったときなど）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1~2滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用せる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と
目やまつ毛が
ぶれるこ
のないように

成 分

ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005% アラントイン 0.1%
L-アスパラギン酸カリウム 1% ピリドキシン塩酸塩 0.1%
クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.02% 塩酸テトラヒドロゾリン 0.01%
添加物として、塩化Na、ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、d-カンフル、ペパーミントオイル、
プロピレンジリコール、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na、
ポリソルベート80、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1