荒れた胃の粘膜を、覆って守る 1.638g×36包

食前の空腹時にも

胃がキリキリと痛い時に

1 速効性の制酸剤
炭酸水素ナトリウム
重質炭酸マグネシウム
沈降炭酸カルシウム

2 持続性の制酸剤
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム

3 胃酸の抑制
ロートエキス

4 傷ついた粘膜の修復
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
L-グルタミン

▼切りはなして取り出しやすくできます▼

すっきり服用感

胃の痛み・不快感に効く

ROHTO

胃粘膜修復剤配合胃腸薬

パンシロン®AZ

荒れた胃の粘膜を、覆って守る

キリキリと痛む胃にも

胃粘膜の修復を促進する成分を配合

ACESSIBLE

ロート製薬

第2類医薬品 36包

English 简体中文 繁體中文

■効能・効果
胃痛、胃部不快感、胸やけ、胃重、胃もたれ、胃酸過多、胃部膨満感、胸つかえ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、げっぷ(おくび)、飲みすぎ

■用法・用量
次の量を食間又は食間の空腹時に水またはお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	3回
11才以上15才未満	2／3包	
11才未満	服用しないこと	

*食間とは…食後2～3時間をさす。

(用法・用量に関連する注意)
(1)用法・用量を厳守すること。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

□成分・分量(3包中)

有効成分	配合量
炭酸水素ナトリウム	1800mg
重質炭酸マグネシウム	180mg
沈降炭酸カルシウム	540mg
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	600mg

有効成分	配合量
ロートエキス	30mg
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	6mg
L-グルタミン	900mg

添加物:カンゾウ、ℓ-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、D-マンニトール

ROHTO
ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク
東京:03-5442-6020
大阪:06-6758-1230
受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

4 987241 103690

使用期限
製造番号
[redacted]

Reco ココロもカラダも 快適な毎日に 本製品には、植物由来のセルロースを使用しています。

■保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。(5)1包を分けて服用した時の残りは、袋の口を折り返して封をするように閉じ、2日以内に使用すること。

10369020F

荒れた胃の粘膜を、覆って守る

販売名:パンシロンAZ
GASTRIC MUCOSA PROTECTION&ANTACID
(for gastralgia, gastric distress)

押してあける

胃腸薬 第2類医薬品

服用前にこの外箱の記載事項を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう保管すること。

⚠使用上の注意
☒ してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1.次の人は服用しないこと 2.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。胃腸鎮痛鎮痙薬 3.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある) 4.長期連用しないこと。

相談する こと 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)妊娠又は妊娠していると思われる人(3)高齢者(4)薬をだいたい7プルイキー症状を起こしたことがある人(5)次の症状のある人:排尿困難(6)次の診断を受けた人:腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害 2.服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。口のかわき 4.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

その他の注意 母乳が出にくくなることがある。