

FOZ449001

使用期限 製造番号



4 987241 103720

有効成分		有効成分・分量(3包中)	
フロキサム	15mg	ニソソ末	225mg
リパーゼAP6	60mg	ケヒ末	435mg
炭酸水素ナトリウム	1200mg	L-カルタミン	405mg
炭酸マグネシウム	690mg	アルギン酸	150mg
沈降炭酸カルシウム	360mg	カンゾウ末	225mg
マグネシウム	240mg	ピオチン	90mg
ローエキス	30mg		

添加物:ホビタ、アルギン酸ナトリウム、L-メントール、ヒマ油、D-ソニール、L-ロシロキアセチルロース

1 2 3  
4 5 6

お客様さま安心サポートデスク  
東京:03-5442-6020  
大阪:06-6758-1230  
受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO  
ロート製薬株式会社  
大阪市野区異西1-8-1

■保管及び取扱い上の注意  
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。(5)1包を分けて服用したときの残りは袋の口を折り返して封をするように閉じ、2日以内に使用すること。

就寝前にも飲める

# パンシロン®

複合胃腸薬

すばやく 消化不良にスーッと効く!!

服用感

食べすぎ・飲みすぎ・胸やけ  
夜遅い食事で、胃がもたれる

48包

ロート製薬 サツと溶ける微粒

QRコード

英語 日本語 繁體中文

第2類医薬品

溶けやすい・飲みやすい

■効能・効果  
飲みすぎ、はきけ(むかひつき)、二日酔い、悪酔い(むかひつき、悪心)、嘔吐、胃部不快感、食へすぎ、消化不良、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胃弱、胸やけ、胃痛、胃酸過多、げっぷ(お<V>)、胃もたれ、胃重、胸つかえ、胃部、腹部膨満感


■用法・用量 次の量を食後又は食間、就寝前に水又はお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	3回
5才以上8才未満	1/3包	
5才未満	服用しないこと	

※食間とは...  
食後2~3時間をさす。

(用法・用量に関連する注意)  
(1)用法・用量を厳守すること。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931



## お休み前にもパンシロン!

販売名: パンシロン01プラス  
GENERAL DIGESTIVE MEDICINE  
(for indigestion, after eating/drinking too much)

1.50g×48包

胃腸薬 第2類医薬品

服用前にこの外箱の記載事項を必ず読むこと。  
また、必要な時に読めるよう保管すること。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1. 次の人には服用しないこと。透析療法を受けている人 2. 本剤を服用している間は次の医薬品を服用しないこと。胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。(母乳に移行して乳児の脈が速くなる可能性がある) 4. 長期連用しないこと。

■ 相談すること 1. 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人: 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。口のかゆみ 4. 2週間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

[その他の注意] 母乳が出にくくなる可能性がある。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ