

使用前にこの説明書をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。



メンソレータム®
カブレーナ®

第2類医薬品
**大人の
尿かぶれなどの治療薬**

販売名：メンソレータム®カブレーナ®
〈皮膚炎・湿疹用薬〉

メンソレータム®カブレーナ®は、
デリケート部位の痛がゆいかぶれ、
つらいかゆみ症状をしっかりと鎮める治療薬です。


気になるこんな部位・症状に

吸水パッド
紙パンツ

などによる
かぶれ、かゆみ


デリケート部位
が痛がゆい

尿や汗蒸れ
による
かゆみ、湿疹



かゆみだけでなく、
炎症を起こしたかぶれ症状にまで効く
大人の尿かぶれ治療を考えた処方設計です。

サラッとクリームが
しっかり効いていきます。



イメージ図

ウフェナマート

グリチルレチン酸

かぶれ・皮膚炎などの炎症を鎮める

ジフェンヒドラミン

かゆみを和らげる

ベンゼトニウム塩化物

雑菌の繁殖をおさえる

トコフェロール酢酸エステル

血行を促進して
患部の修復を促進

ステロイド成分は配合していません。

使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
3. 1～2週間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

■ 効能・効果

かぶれ、おむつかぶれ、皮ふ炎、かゆみ、湿疹、ただれ、あせも

■ 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみご使用ください。
- (4) 患部を清潔にした後、ご使用ください。

■ 成分・分量(1g中)

ウフェナマート 50mg、ジフェンヒドラミン 10mg、トコフェロール酢酸エステル 5mg、グリチルレチン酸 3mg、ベンゼトニウム塩化物 1mg

添加物として、セタノール、サラシミツロウ、ステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリリルペート60、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、パラベンを含有する。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1