

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



メンソレータム®
メディクイック®E

耳などのかゆみ治療薬 第②類医薬品
メンソレータム® メディクイック® E

**メンソレータム® メディクイック® Eは、
繰り返す耳などのかゆみをすばやく抑える治療薬です。**

6つの有効成分配合

かゆみを抑える

クロタミトン (かゆみ止め成分)
& メントール (清涼成分)

かゆみの元となる 炎症を鎮め、患部を殺菌

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
(アンテドラッグステロイド/抗炎症成分)
グリチルレチン酸 (抗炎症成分)
イソプロピルメチルフェノール (殺菌成分)

荒れた皮ふを修復する

アラントイン (皮ふ修復成分)

本剤は耳の中以外の皮ふにもお使いいただけます。

繰り返す耳のかゆみとは？

耳の中の皮ふは外部からの刺激に敏感で、耳かきやイヤホンの装着などが刺激となり炎症が悪化すると、繰り返すかゆみの原因となります。しつこいかゆみを治療するには、耳かきなどの刺激になる行為は控え、かゆみと炎症をしっかり鎮めることが大切です。

治療のコツ

● 刺激を与えない

耳かきやイヤホンの装着などは耳に刺激を与え、炎症、かゆみを悪化させてしまいます。

● 適量を数回に分けて使用する

一度に大量にまとめぬりしても効果が上がるものではありません。

● 徐々に減らしていく

症状が治ってきたら使用回数を徐々に減らしていきましょう。

- ・ 症状のない部位には使用しないでください。
- ・ 症状が治りにくい時、また、慢性的に症状を繰り返す方は、医師に相談されることをおすすめします。

使用上の注意 ⚠

してはいけないこと ❌ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部
(2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 患部が広範囲の人
(5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症 状 |
|--------|--------------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感 |
| 皮ふ(患部) | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

■**効能・効果** 湿疹、皮ふ炎、かゆみ、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ

■**用法・用量** 1日数回、適量を患部に塗布してください。

【耳の中の皮ふに使用する場合の容器のご使用方法】

■下記の使い方を必ず守ってください。

■本品は点耳薬ではありません。耳の中に直接滴下しないでください。

※本品に綿棒は付属されていません。




①机の上にティッシュ等を敷いた上でご使用ください。

(薬液が過剰に出てこぼれ落ちることがあります。衣服等につかないようご注意ください。)

②容器の先端を綿棒に垂直に軽く当ててください。そのまま先端が引っ込むように数秒押しつけると、少しずつ薬液が出てきます。これを数回繰り返し、綿棒全体にしみこませてください。


③薬液がついた綿棒で患部に塗布してください。

※耳の奥まで綿棒を入れないでください。



先端が引っ込むまでやさしく押しつける

容器本体部分は強く押さないでください。薬液が過剰に出る場合があります。



耳の中の皮ふに薬液を塗布するときは、耳の奥や鼓膜を傷つける恐れがありますので、耳の奥まで綿棒を入れないでください。綿球の先から約1.5cmの部分(綿球の下)を持って、擦らずにやさしく塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 外用のみにご使用ください。
5. 使用前に、容器を上に向け、手の指で容器先端を押して中の空気を抜いてください。

<耳の中の皮ふに使用する場合の注意>

- (1) 本剤は点耳薬ではありません。直接耳の中に滴下しないでください。
- (2) 薬液が耳の奥に垂れないように、【耳の中の皮ふに使用する場合の容器のご使用方法】を必ず守ってください。
- (3) 長期連用しないでください。(目安として2週間程度)
- (4) 鼓膜に穴が開いていることが疑われる場合、または耳だれが出ている場合は、使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
- (5) 使用後、耳が聞こえにくくなった場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
- (6) 10才未満は使用しないでください。なお、小児(15才未満)だけでの使用はおやめください。
- (7) 本剤塗布直後はイヤホンや補聴器を使用せず、十分に乾いたことを確認してから使用してください。(目安として1時間後)

■**成分・分量**

| 有効成分 | 分量(1mL中) | 作用 |
|--|----------|------------|
| プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) (アンテドラッグステロイド) | 1.5mg | 炎症をしっかり鎮める |
| クロタミトン | 50mg | かゆみを抑える |
| グリチルレチン酸 | 10mg | 炎症をしっかり鎮める |
| アラントイン | 2mg | 皮ふを修復 |
| イソプロピルメチルフェノール | 1.5mg | 患部を殺菌 |
| β-メントール | 35mg | 清涼成分 |

添加物として、エタノール、1,3-ブチレングリコール、ラウロマクロゴール、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、pH調節剤、ヒアロン酸Naを含有する。

■**保管及び取扱上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 本剤はアルコール類を含むため、イヤホン、補聴器、メガネ、アクセサリ類、時計、寝具、家具、床、化繊製品、プラスチック類、皮革製品などにつかないように十分ご注意ください。(材質によっては落ちにくいことや変色することがあります)
- (6) 染めた髪につくと色落ちすることがあります。
- (7) 火気に近づけないでください。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんかと、「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230 受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHT ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

402181301