

▼
押してあける

【効能・効果】ニキビ

【用法・用量】1日2回(朝・晩)、適量を患部に噴霧すること。顔に使用する場合は、適量を手にとり、患部に塗布すること。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合は使用を避けること。(2)用法・用量を厳守すること。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(4)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(5)外用にのみ使用すること。

【成分・分量】(100g中)

イソプロピルメチルフェノール…0.3g
 サリチル酸…0.5g
 アラントイン…0.2g

添加物として、1,3-ブチレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリリソレト20、エトド酸Na、L-アラギニン、クロロブタノール、2,2',2"-ニトロトリエタノール(トリエタノールアミン)、ニコチン酸アミド、香料を含有する。

【保管及び取扱上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2)小児の手の届かないところに保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。(5)冷所に保管すると結晶が析出することがあるため、0℃以下での保管は避けること。(6)火の近くでの使用および保管は避けること。(7)衣服、寝具、家具、床等につかないように十分注意すること。(材質によっては落ちにくいことや変色することがある)

【販売名】メンソレータムアクネス25
 メディカルミストb
 Acne Treatment Mist

第2類医薬品 | ニキビ治療薬

使用前に外箱の説明書きを必ず読むこと。また、必要なときに読めるよう保管すること。

△使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の部位には使用しないこと。
 目や目の周囲

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 (1)医師の治療を受けている人
 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 (3)患部が広範囲の人
 (4)湿潤やただれのひどい人
 (5)深い傷やひどいやけどの人
 (6)硬結(硬いしこり)のある重症の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
4. その他 (1)本剤は傷口があるとしみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがある。刺激が気になる場合は、使用を中止すること。(2)本剤の使用により、皮膚が多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがある。そのときは使用を一時中止すること。再び使用するときは間隔をあけて使用すること。

100mL MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

背中・デコルテなどの ニキビ治療薬

ミストタイプ



MEDICAL MIST

広がるニキビの 元から効く!



※早く使用すること
 *サリチル酸は角質軟化作用により毛穴詰りを取り除きます。

第2類医薬品 | 100mL | ロート製薬

3つの有効成分配合

殺菌 | 毛穴詰り除去* | 組織修復

イソプロピルメチルフェノール | サリチル酸 | アラントイン

*サリチル酸は角質軟化作用により毛穴詰りを取り除きます。

有効成分が患部に浸透し
 ニキビの元からしっかり効く


【アクネ菌の巣】とは、アクネ菌同士が好んで集まっているかたまりのこと。



メディカルミストの特徴

ミストタイプなので、手の届きにくい背中などのニキビの治療にもおすすめです。

逆さまにしても使える
 ミストタイプ



ROHTO ロート製薬株式会社
 大阪市生野区巽1-8-1

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230

受付時間: 9:00~18:00 (注、日、祝日を除く)