

服用前に、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

下痢に効く(5才~大人)

# ビオフェルミン<sup>ししゃやく</sup>® 止瀉薬

乳酸菌入り下痢止め

第2類医薬品

## 特徴

### ●腸の動きを整える

タンニン酸アルブミンが腸の過剰な動きを整え下痢に効きます。

### ●腸粘膜を保護し、腸の動きを整える

ゲンショウコエキスが荒れた腸粘膜を保護し、過剰な動きを整えます。

### ●腸内環境を整える

乳酸菌が下痢で乱れた腸内環境に作用し、腸の調子を整えます。



## ⚠️ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

本剤または本剤の成分、牛乳によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬

#### 3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)

#### 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人または粘液便の続く人。

(3) 急性の激しい下痢または腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。

(4) 妊婦または妊娠していると思われる人。

(5) 高齢者。

(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(7) 次の症状のある人。

排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。

心臓病、緑内障

(9) 副交感神経遮断剤(ベラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド、

ロートエキス等)を含有する内服薬を服用している人。

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を

中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、 動悸、意識の混濁等があらわれる。

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または

増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師

または登録販売者に相談してください

#### 4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書

を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

## 効能

下痢、軟便、腹痛を伴う下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、くだり腹、はき下し



## 用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で服用してください。

年令	1回量	服用回数
15才以上	1包	1日3回
11才～14才	$\frac{2}{3}$ 包	
8才～10才	$\frac{1}{2}$ 包	
5才～7才	$\frac{1}{3}$ 包	
5才未満	服用しないこと	

### <注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分 3包(3.6g)中

成分	含量	はたらき
タンニン酸アルブミン	2,700mg	腸の過剰な動きを整えて下痢に効きます。
ゲンノショウコエキス	600mg	荒れた腸粘膜を保護し、腸の過剰な動きを整えます。
ロートエキス	33mg	生薬成分が下痢でおなかが痛いときによく効きます。
フェーカリス菌末	180mg	下痢で乱れた腸内環境に作用し、腸の調子を整えます。


添加物：バレイショデンプン

### <注意>

生薬(薬用の草根木皮など)を用いた製品ですから、製品により細粒の色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

製造販売元 **ビオフェルミン製薬株式会社** 販売元 **大正製薬株式会社**

神戸市西区井吹台東町七丁目3番4

東京都豊島区高田3丁目24番1号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話:0120-149-931(フリーダイヤル)