

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2種類の乳酸菌+生薬+消泡剤+ビタミンが
ガスによるおなかのハリを改善します。


ビオフィルミン® ぽっこり整腸チュアブル^a

整腸薬

第3類医薬品

特徴

- ジメチルポリシロキサンが発生したガス気泡[※]をつぶし、ケツメイシが腸のはたらきを整え、おなかのハリ(腹部膨満感)を改善します。
 - 乳酸菌(ビフィズス菌、ラクトミン)が、ガス発生の原因となっている悪玉菌の増殖を抑え、ガスの発生しにくい腸内環境に整えます。
 - パントテン酸カルシウムが腸内の乳酸菌の生育をサポートします。
 - 水なしでのめるヨーグルト風味のチュアブル錠です。
- ※ガス気泡：泡のような状態のガス



⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 次の診断を受けた人。
フェニルケトン尿症
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能

腹部膨満感、整腸(便通を整える)、便秘、軟便



腹部膨満感



整腸
(便通を整える)



便秘



軟便

用法・用量

次の量を、4時間以上の服用間隔で、かむか、口中で溶かして服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-------|---------|--------|
| 15歳以上 | 1錠 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないこと | |

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 本剤は必ず、かむか、口中で溶かして服用してください。
(そのまま飲み込むと、のどに詰まることがあります。)

成分

3錠(15歳以上の1日服用量)中

| 成分 | 分量 | はたらき |
|--|--------|------------------------------------|
| ビフィズス菌 | 30mg | 腸内環境を整えるとともに、ガス産生菌の増殖を抑えます。 |
| ラクトミン | 30mg | |
| ケツメイシエキス (ケツメイシ約1,200mgより抽出) | 120mg | 腸のはたらきを整え、便を出しやすくします。 |
| ジメチルポリシロキサン | 180mg | 腸内にたまったガス気泡をつぶし、ガスによるおなかのハリを改善します。 |
| パントテン酸カルシウム タイプS (パントテン酸カルシウムとして22.5mg) | 34.6mg | 腸内の乳酸菌の生育をサポートします。 |


添加物: トウモロコシデンプン、エリスリトール、無水ケイ酸、セルロース、還元麦芽糖水アメ、アメ粉、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、アスコルビン酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳酸Ca、スクラロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料

<成分に関連する注意>

- (1) 生薬(薬用の草根木皮など)を用いた製品ですから、製品により錠剤の色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。
- (2) まれに錠剤に黒い点が見られることがありますが、これはケツメイシによるものであり、品質には問題ありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 容器の中の詰め物は、フタをあけた後はすててください。
(詰め物を再び容器に入れると湿気を含み品質が変わるものになります。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものです。)
- (5) 服用のつど容器のフタをしっかりとめてください。
(他のおいが移ったり、吸湿し品質が変わることがあります。)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (7) 箱と容器の「開封年月日」記入欄に、容器を開封した日付を記入してください。
- (8) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。



包装

30錠、60錠

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
 BioFermil製薬株式会社 お客様相談窓口
〒650-0021 神戸市中央区三宮町一丁目1番2号 電話 (078)332-7210
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **BioFermil製薬株式会社**
神戸市西区井吹台東町七丁目3番4

販売元 **大正製薬株式会社**
東京都豊島区高田3丁目24番1号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)