

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

つらいのどの痛み・せき・鼻みず・熱に **1日2回で長く効く**

# 持続性パブロン錠

販売名：持続性パブロン錠  
第②類医薬品 〈かぜ薬〉

イブプロフェン・アンブロキシソール塩酸塩配合

- ◆持続性パブロン錠は、解熱鎮痛成分：イブプロフェン、気道粘膜ケア成分：アンブロキシソール塩酸塩など6種類の有効成分を配合し、のどの痛み、せき、鼻みず、発熱などつらいかぜの11症状に効果をあらわすかぜ薬です。
- ◆早く溶ける層、ゆっくり溶ける層からなる「時間差アクション錠」により、朝・夕1日2回の服用で効果が持続します。
- ◆飲みやすい小粒錠、ノンカフェインのかぜ薬です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1 次の人は服用しないでください
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3) 15才未満の小児。
  - (4) 出産予定日12週以内の妊婦。
- 2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
 

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 3 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
 

(眠気等があらわれることがあります)
- 4 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 5 服用前後は飲酒しないでください
- 6 5日間を超えて服用しないでください



## 相談すること

- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
  - (7) 次の病気がかったことのある人。  
胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病
- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、浮腫、青あざができる
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃痛、口内炎、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便、胃・腹部膨満感
精神神経系	めまい、しびれ感
循環器	動悸
呼吸器	息切れ
泌尿器	排尿困難
その他	目のかすみ、耳なり、むくみ、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中、の痛み、過度の体温低下、からだがたるい

まれに右記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首すじのつばりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気、嘔吐等があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。)
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症 呼吸抑制	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 

便秘、口のかわき、眠気
- 4 3～4回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 

(特に熱が3日以上続いたり、又は熱が反復したりするとき)

## 用法・用量

次の量の水又はぬるま湯で服用してください。

朝夕食後なるべく30分以内に服用してください

年齢	1回量	服用回数
成人 (15才以上)	3錠 	1日2回
15才未満	服用しないこと	

### 【注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 錠剤を割ったり、砕いたり、すりつぶしたりせず、そのまま噛まずに服用してください。
- 錠剤の取り出し方  
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

〈錠剤の取り出し図〉



## 効 能

かぜの諸症状(のどの痛み、せき、たん、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、発熱、悪寒(発熱によるさむげ)、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

のどの痛み・  
発熱などに



くしゃみ・  
鼻みず・  
鼻づまりに



せき・たん



## 成 分

1日量(6錠)中

イブプロフェン 400mg  
炎症・痛みのもとにはたらき、のどの痛みや熱をしずめます。

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg  
くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます。

ジヒドロコデインリン酸塩 16mg  
せき中枢にはたらき、せきをしずめます。

d,l-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg  
気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。

アンブロキシオール塩酸塩 45mg  
気道粘膜の線毛運動を活性化し、粘膜表面をなめらかにすることで、のど症状の原因の一つであるたんを出しやすくします。

リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>) 8mg  
かぜの時に消耗しやすいビタミンを補給します。

添加物：セルロース、無水ケイ酸、リン酸水素Ca、ヒプロメロース、デンプングリコール酸Na、ステアリン酸Mg、クエン酸

### 【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB<sub>2</sub>によるもので、ご心配ありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://brand.taisho.co.jp/pabron/>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)