

## ビルトン MAX

【成分・分量】 1本(50mL)中  
トシエキス……………50mg  
(原生薬トシとして500mg)  
イカリソウエキス……………100mg  
(原生薬イカリソウとして1000mg)  
ニンジンエキス……………60mg  
(原生薬ニンジンとして666mg)  
オキソアミチン末……………50mg  
(加工ダイサン末)  
チアミン衛化物(ビタミンB<sub>1</sub>衛酸塩)…10mg  
リボフラビンリン酸エステルナトリウム  
(ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル)…5mg  
ピリドキシン塩酸塩……………10mg  
(ビタミンB<sub>6</sub>)  
無水カフェイン……………50mg  
添加物:クエン酸、dl-リンゴ酸、白糖、D-  
ソルビトール、ハチミツ、バラペリン、プロ  
ピレングリコール、エタノール、香料

### 【効能・効果】

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉體疲  
勞・病中病後・食欲不振・栄養障害  
・発熱性消耗性疾患・産前産後な  
どの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(50mL)  
を1日1回服用してください。  
○用法・用量を厳守すること。

## 滋養強壮

### 4種類の生薬成分配合

ニンジン、イカリソウ、トシエ  
キソアミチン

# ビルトン MAX

第2類医薬品 50mL

製造販売元  
中外医薬生産株式会社  
三重県伊賀市砂が丘7-5-5

### △【使用上の注意】

#### ■【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は  
副作用の可能性があるので、直ちに服  
用を中止し、この製品を持って医師、薬  
劑師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

2.しばらく服用しても症状がよくなり  
ない場合は服用を中止し、この製品を持  
って医師、薬劑師又は登録販売者に相  
談すること

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保  
管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用  
の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しない  
こと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈  
殿を生じることがあります。よく振ってから  
服用してください。 02MAELMA

製造番号

使用期限