

△【使用上の注意】 ■ 相談すること
1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【関係部位】 症状

皮膚 発疹・発赤、かゆみ
2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 ○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体的労・病中病後・食欲不進・栄養障害・発熱時・消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】 成人(15歳以上)1日1回1本を服用して下さい。

○用法・用量を厳守すること

【成分・分量】 1本(50mL)中 チアミン併合物(ビタミンB1併合物)10mg、リボフラビン併合物(ビタミンB2併合物)10mg、ピリドキシン併合物(ビタミンB6)20mg、ニコチン酸アミド40mg、タウリン1000mg、L-リシン80mg、L-ロイシン180mg、L-イソロイシン80mg、ヨクイニンエキス150mg(ヨクイニンとして1950mg)、ローヤルゼリーチン牛300mg(ローヤルゼリーとして300mg)

添加物:クエン酸、クエン酸Na、dl-リンゴ酸、L-アスロトール、アセシルファムK、スクラロース、パラベン、香料

02S02ELH

疲れたときに 65^{10h} kcal
/mgカフェイン

セラ
Vitamin B
ローヤルα
+ 栄養補給に

ヨクイニン ローヤルゼリー
タウリン アミノ酸

50mL 第3類医薬品

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

販売名
セラロBBローヤルα
【保管及び取扱上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(替用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、ビタミンB₂併合物(ニコチン酸アミド)によるものですので心配ありません。副作用報告飲酒制度 ☎0120-149-931

お客様相談室：0595-21-3200
受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ガラス：ピン 金属：キャップ

製造番号

使用期限

4

987307422277

