



第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



鎮咳去痰薬
たん、たんのからむせきに

ストナ[®]去たんカプセル

L-カルボシステイン・ブロムヘキシン塩酸塩配合

ストナ去たんカプセルは…

- 2つの去たん成分(L-カルボシステイン・ブロムヘキシン塩酸塩)を配合しています。
- L-カルボシステインはたんの通りをスムーズにし、ブロムヘキシン塩酸塩はたんをサラサラにし、たん、たんのからむせきに効果をあらわします。
- 8才のお子様から服用できます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、腹痛
精神神経系	頭痛
そ の 他	血たん

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
下痢、口のかわき

4. 3~4日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

たん、たんのからむ咳

〔用法・用量〕

下記の1回服用量を食後に服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	2カプセル	3回
8~14才	1カプセル	
8才未満	服用しないでください	

本剤の服用により、一時的にたんの量が増加することがあります。

〔用法・用量に関連する注意〕

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、表面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってシートに入ったまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

(3) 定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量と働き〕6カプセル中

成 分	分 量	働 き
L-カルボシステイン	750mg	気道粘膜を正常化し、粘稠なたんの流動性を高めてたんを出しやすくします。
プロムヘキシン塩酸塩	12mg	気道分泌を高め、のどにからんだたんをうすめて出しやすくします。

添加物として、中鎖脂肪酸トリグリセリド、サラシミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、セスキオレイン酸ソルピタン、ポリソルベート80、ゼラチン、グリセリン、パラベン、酸化チタン、香料(*l*-メントールを含む)を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)

(4) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は、服用しないでください。



◎早くよくなっていたりするためのアドバイス

1. 水分を多くとるようにしましょう。たんのきれいがよくなり、せきが楽になります。

2. 部屋の空気をきれいにしましょう。また、部屋をあたため、なるべく湯気をたてて空気の乾燥を防ぎましょう。

3. うがいを心がけましょう。のどの不快感が少なくなり、せきやたんが楽になります。外出のときは、マスクも効果があります。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/ikenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号