

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。

乗物酔い薬

シックS錠

第2類医薬品

シックS錠は、バスや電車、船などの揺れによる刺激で生じる耳の奥にある三半規管の興奮を鎮め、嘔吐中枢の興奮を抑え、吐き気、めまいなどの乗物酔いによる症状を緩和する乗物酔い薬です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人 排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人 緑内障、心臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、 異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

■ 効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

■ 用法・用量

次の量を服用してください。ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1錠	1回
15歳未満	服用しないこと	

※定められた用法・用量を厳守してください。

■ 成分・分量

1錠中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
塩酸メクリジン	25mg	内耳器官と嘔吐中枢の興奮を抑え、めまい、吐き気、頭痛を鎮めます。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.2mg	自律神経の興奮状態を緩和し、めまい、吐き気を鎮めます。
ピリドキシン塩酸塩	10mg	めまい、吐き気を鎮めます。
無水カフェイン	20mg	乗物酔いからくる頭痛をやわらげます。

添加物として乳糖、バレイシヨデンブン、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、サッカリンNa、ステアリン酸Mg、香料、トコフェロールを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■ 乗物酔いを避けるために、次の点にもご注意ください。

- ・乗物に乗る前夜は睡眠を十分にとりましょう。
- ・揺れが少ない前方の席や窓際の席を選びましょう。
- ・飲み過ぎ食べ過ぎはさけましょう。
- ・おしゃべりで気分を楽にしましょう。

■ お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
日野薬品工業株式会社
お客様相談窓口
電話0748-52-1232 受付時間 9時～17時(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **日野薬品工業株式会社**
滋賀県蒲生郡日野町上野田119