

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

肌を治すチカラ  
**muHI**

くり返しパックリ<sup>®</sup>割れる  
ひび・あかぎれの治療薬


**ヒビケア軟膏<sup>a</sup>**

販売名:ヒビケア軟膏a

## ■くり返しパックリ割れて治りにくかったひび・あかぎれ…どうして？

それは、お肌の細胞がひび・あかぎれを自分自身の力で十分修復しきれない…それほどまでに弱っているからです。

寒さや水仕事により手指などの血行が悪くなると、栄養が肌細胞までとどきにくくなります。このような状態が長引くと、肌細胞はすっかり元気を失い、本来持つ「ひびを修復する力」が十分に発揮できなくなるのです。



《模式図》

## ■肌細胞の修復力が弱っている。だから「ひび修復促進成分」W配合！

くり返すひび・あかぎれをしっかり治すためには、弱った肌細胞の修復力を回復させることが最も重要です。ヒビケア軟膏aは、割れた皮ふ組織に直接はたらき修復を助けるアラントインと、肌細胞に元気を与え修復を助けるパンテノールをW配合。2つの「ひび修復促進成分」が肌に集中的にはたらくので、くり返し「パックリ」割れて治りにくかったひび・あかぎれもしっかり治療します。



《イメージ図》

さらに、血行促進成分、保湿成分、かゆみをおさえる成分がバランスよく配合されていますので、ひび・あかぎれに伴うかさかさ、かゆみなどの症状をやわらげ、手指などの患部全体を正常な肌状態に近づけていきます。



### 使用上の注意

#### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人。

(2)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 ふ  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

## 効能

ひび、あかぎれ、しもやけ

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### <用法・用量に関する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後1ヶ月以上です。

(2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。

(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

《チューブの開け方》



## 成分とそのはたらき

有効成分 (100g中)

| 成 分              | 分 量    | は た ら き              |
|------------------|--------|----------------------|
| アラントイン           | 0.2 g  | 割れた皮ふ組織の修復を助けます。     |
| パンテノール(プロビタミンB5) | 1.0 g  | 肌細胞の正常なはたらきを助けます。    |
| トコフェロール酢酸エステル    | 0.2 g  | 血行を促進し、患部の回復を早めます。   |
| グリセリン            | 40.0 g | 保湿成分で、お肌にうるおいを与えます。  |
| ジフェンヒドラミン        | 0.5 g  | ひび・あかぎれに伴うかゆみをおさえます。 |

添加物としてステアリルアルコール、ステアリン酸、トリイソオクタン酸グリセリン、ベヘニルアルコール、ベヘン酸、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸ソルビタン、クエン酸を含有します。

本剤にステロイド成分は配合されていません

## 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

(5)使いやすいラミネートチューブです。破れにくい特長がありますが、強く押すと中身が飛び出す場合があります。チューブ尻から順次軽く押し出すようにして使用してください。

## お子さまが誤ってヒビケア軟膏aを口にした場合

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげてください。
- ②少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にすると眠気があらわれることがあります。
- ③1時間ほど様子を見て、呼吸などに異常がある場合は、医師に診てもらってください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 ☎ 930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地  
☎ 076-472-0911 [電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00]

®登録商標

製造販売元

**MUHI**

株式会社 池田模範堂  
富山県中新川郡上市町神田16番地

SS01