

第3類医薬品

ムヒの のどスプレー

のどの痛み・声がれ、口内炎に




開封年月日


年 月 日

開封後はなるべく早く
使用してください。

使い方




① 容器のキャップを
はずしてください。



② 「アー」と声を出しながら容器頭部を
押し、患部に薬液を2〜3回噴射
塗布してください。

※ 使い始めは、数回空押ししてください。



③ 使用後は、ノズルをティッシュ等で
拭き取り、キャップをしてください。

本品は大人の方も
お使いいただけます

MADE IN JAPAN 日本製



4 987426 002831

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



ムヒの のどスプレー

のどの痛み

声がれ、口内炎に



ふわっ
と広がる
ミストタイプ

お子さま好みの
イチゴ味
30mL

(イメージ図)

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ、のどの
痛み、のどのはれ、のどの不快感、
声がれ、口内炎。

有効成分(100mL中)

アスプレルホン酸ナトリウム水和物
…0.02g

添加物としてセチルピリジニウム塩
化物、グリセリン、還元麦芽糖水アム、
クエン酸、クエン酸Na、水酸化Na、
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、
香料、エタノールを含有します。

本剤は青紫色の透明な液体です

保管及び取扱上の注意

- ① 直射日光の当たらない涼しい所に
保管してください。
- ② 小児の手のとどかない所に保管
してください。
- ③ 他の容器に入れかえないでくだ
さい(誤用の原因になったり品質
が変わります)。
- ④ 薬液が衣服等に付着すると着色
します。付着した場合はすぐに水
でよく洗い落としてください。
- ⑤ ノズルの先端の穴を針等で突か
ないでください。使用時に薬液が
出にくくなる場合があります。
- ⑥ 使用期限(ケース底面及び容器底
面に記載)を過ぎた製品は使用
しないでください。

お薬様相談窓口：株式会社池田模範堂
☎076-472-0911
(月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)

発売元 **MUHI**
株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地
製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
奈良県橿原市上品寺町515

開き口

第3類
医薬品

販売名 ムヒののどスプレー □腔内消炎剤

ご使用に際して、この説明文書(ケース)を必ず
お読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してく
ださい。

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている
人。(2) 口内のただれがひどい人。(3) 薬など
によりアレルギー症状を起こしたことがある
人。
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作
用の可能性がありますので、直ちに使用を中
止し、この説明文書(ケース)をもって医師、
歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談し
てください
- | 関係部位 | 症 状 |
|--------|----------------|
| 皮膚又は口腔 | 発疹・発赤、かゆみ又は刺激感 |
3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場
合は使用を中止し、この説明文書(ケース)を
もって医師、歯科医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください

用法・用量

1日、数回、適量を患部に噴射塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支
や肺に入ることがありますので、のどに使用す
る場合には、声を出しながら噴射してください。
- (3) のどや口内の患部の塗布用のみ使用し、
内服しないでください。(4) 小児に使用させる
場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ
てください。(5) 目に入らないように注意してく
ださい。万一目に入った場合には、すぐに水又は
ぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて
ください。

第3類医薬品

池田模範堂 プローセル 716-1, NTV



登録商標

1

製造番号
使用期限(年、月)



AA04