

販売名 ムヒパッチA

第3類医薬品

鎮痒消炎剤

効能 虫さされ、かゆみ、しもやけ

使用に際して、このケースをよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

傷口、湿潤、かきこわし、ただれ、かぶれ、目の周囲、粘膜、顔

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースをもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースをもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 ☎076-472-0911

〔電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00〕

本剤にステロイド成分は配合されていません

税 控除 対象

発売元 **MUHI**

製造販売元

用法・用量 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。使用開始目安年齢：1才以上 (2) 外用にのみ使用し、内服しないこと。(3) 1回の使用は4~5時間を目安とし、同じ場所に長時間の使用はさけること。皮膚の弱い方は、本剤を同じ場所に続けて使用しないこと。まれに貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがある。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用すること。

有効成分 1.25m² (膏体100g) 中

ジフェンヒドラミン(かゆみ止め成分) 1.0g / イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤) 1.0g / l-メントール(清涼感剤) 3.0g

添加物として生ゴム、スチレン・インブレン・スチレンブロック共重合体、エステルガム、ポリブテン、テルペン樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、脂環族飽和炭化水素樹脂を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。(3) 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) 開封後はアルミ袋を折り線で2回折りまげて保管し、使用期限内であっても、なるべく早く使用すること。(5) 使用期限(ケース及びアルミ袋に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

包装 38枚入(直径2.8cm)

®登録商標

開き口



4 987426 300128

株式会社 池田模範堂

富山県中新川郡上市町神田16番地

株式会社 大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

使用期限(年.月)

製造番号