

第3類医薬品

RAKCOOL

100mL  
大容量

ラクール 外用消炎・鎮痛剤  
ラクペタン液

【成分・分量】100mL中

サリチル酸グリコール…2,500mg  
β-メントール…3,000mg  
クロルフェニランメリン酸塩…100mg  
ニコチン酸ベンジルエステル…10mg  
ノニル酸ワニリルアミド…12mg  
添加物：ハアセチルしょ糖、エタノール、プロピレングリコール

【保管及び取扱上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 本剤のついた手で、目などの粘膜にふれないでください。
- 火気に近づけないでください。
- メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化粧の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
- 使用期限(容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

# 肩こり・腰・筋肉 関節の痛みに

血行促進成分が効果を発揮!

ラクール 外用消炎・鎮痛剤  
ラクペタン液



心地よい刺激が  
コリに効く!

サリチル酸グリコール配合

第3類医薬品

製造  
番号

使用  
期限

第3類医薬品

ラクール 外用消炎・鎮痛剤  
ラクペタン液

【効能・効果】

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉疲労、  
肩肉痛、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布して  
ください

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 入浴前後1時間の使用はさけてください。
- 皮膚の弱い人は、同じところに続けて使用しないでください。
- 汗をかいたときなど、本剤による刺激を強く感じる場合がありますので、激しい痛みなどを感じた場合には、使用を中止し、よく泡立てた石けんでやさしく洗い、水で流した後、よく冷やしてください。
- 塗布した患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- 塗布前にスポンジ面を患部に押し当て、薬液がスポンジに浸透していることを確認してください(スポンジが乾いたまま塗布するとスポンジが破れるおそれがあります)。

こちら  
開けてください

第3類  
医薬品

販売名  
ラクペタン液

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- 目の周囲、粘膜等。
- しっしん、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

発売元  
ラクール薬品販売株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆  
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元  
三友薬品株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

副作用被害救済制度  
のお問い合わせ先  
フリーダイヤル  
0120-149-931

