

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

インドメタシン 経皮吸収型鎮痛消炎剤

リフェンダIDH 温感 第2類医薬品

24^(6枚入×4袋)枚入

【特長】

- 肩・腰・関節などの痛みにすぐれた効果を発揮する鎮痛・消炎パップ剤です。
- インドメタシンが患部に直接浸透し、痛みの原因プロスタグランジンの発生を抑えます。
- トウガラシエキ스가、患部に適度な温感効果をもたらします。
- 伸縮性に富んだ不織布を使用しているため、すぐれたフィット感が得られます。

⚠【使用上の注意】

してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

1. 次の人は使用しないで下さい
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないで下さい
(1) 眼の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし、たむし等又は化膿している患部。
3. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能・効果】

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

お問い合わせ先：株式会社タカミツ
フリーダイヤル 0120-459533 / 受付時間 (月～金曜日 9:00～17:00 祝祭日を除く)

【用法・用量】

年 齢	使用方法
15歳以上	表面のライナー(フィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい
15歳未満	使用しないで下さい

【用法・用量に関する注意】

(1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。(2) 痛みやはれ等の症状がある場合だけ使用して下さい。[本剤は、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であり、原因となっている病気を治療するものではありません。](3) 汗をかいていたり、患部がぬれていたりする時は、よく拭き取ってから使用して下さい。(4) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に貼り続けしないで下さい。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。)(5) 打撲(打ち身)、捻挫に使用する場合には、患部の熱感等の症状がおさまってから使用して下さい。(6) 本剤を使用してから汗をかくと刺激を感じることがあります。(7) 本剤に触れた手で、眼の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないで下さい。(8) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないで下さい。(9) 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないで下さい。[強い刺激を感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分程してから使用して下さい。](10) 連続して2週間以上使用しないで下さい。

【成分・分量】 <膏体 100g (1000cm²) 中>

インドメタシン…0.5g トウガラシエキス…0.1g (原生薬換算量1.25g)
添加物:エドト酸Na水和物、マクロゴール、CMC-Na、酸化チタン、カオリン、ジヒドロキシアリルニウムアミノアセテート、香料、グリセリン、D-ソルビトール、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸部分中和物、酒石酸、カルボキシビニルポリマー、パラベン、ヒマシ油

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 高温・直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。[誤用の原因によっては品質が変わるおそれがあります。](4) 開封後は未使用分を袋に戻し、チャックを閉じて保管して下さい。(5) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早くご使用下さい。

【包装】 24枚入 (6枚入×4袋 / 1枚: 10cm×14cm)

製造販売元

株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市長区上飯田東町4の68の1



副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



4 987487 102648

製造番号

使用期限