

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

しっしん・かぶれ・虫さされ・かゆみ
オイラックス[®]A
鎮痒消炎薬

オイラックスAの特徴

- クロタミトンとジフェンヒドラミン塩酸塩が、虫さされ等のかゆみにすぐれた効果を発揮します。
- ヒドロコルチゾン酢酸エステルとグリチルレチン酸が、しっしん・かぶれ等の皮膚の炎症をしずめます。
- アラントインが皮膚の組織修復を助けます。
- イソプロピルメチルフェノールが殺菌作用を発揮します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないで下さい。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

しっしん、かぶれ、虫さされ、かゆみ、じんましん、しもやけ、皮膚炎、あせも

使用法

1日1～3回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。

成分・分量

本剤は、白色のクリームで、100g中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
クロタミトン	10.0g	かゆみをおさえます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.25g	皮膚の炎症をしずめます。
グリチルレチン酸	0.5g	
アラントイン	0.2g	皮膚の組織修復を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用を発揮します。

添加物：ステアリン酸マクロゴール、ステアリルアルコール、ワセリン、香料、グリセリン


〈成分・分量に関連する注意〉

塗布後ほてり(熱感)を感じるがありますが、短時間のうちに消失します。

ヒドロコルチゾン酢酸エステルは、副腎皮質ホルモン(ステロイド)の中で最も作用が緩和なランクに分類されています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山市横越168